

**IMIDAN** | ايميدان  
50wp 50wp

Pesticides  
INSECTICIDE



COMPOSITION

50%  
PHOSMET

**IMIDAN** | ايميدان  
50wp 50wp

FABRICANT. **Gowan**



ج.م. ج.م  
EZZOOUR S.A.



## Composition

Imidan® 50 WP contient 50 % de Phosmet

## التركيبة

إيميدان 50 يحتوي على 50 في المائة من فوسفوميت.  
على شكل مسحوق قابل للبلل.

## الاستعمال

إيميدان 50 مبيد حشري لمحاربة السيغتيت في الحوامض،  
و البسيل في أشجار الإجاص و الكاربووكابس والعنابك الحمراء  
والمن الأخضر في أشجار التفاح و ذبابة الزيتون.

| Usage   | Dose           | Max Appli | Mode Traitement | DAR (j)                     |
|---------|----------------|-----------|-----------------|-----------------------------|
| Agrumes | Cératite       | 100 g/hl  | 1               | Parties aériennes <b>14</b> |
| Olivier | Mouche d'olive | 100 g/hl  | 2               | Parties aériennes <b>21</b> |
| Poirier | Psylle         | 150 g/hl  | 2               | Parties aériennes <b>28</b> |
| Pommier | Carpocapse     | 150 g/hl  | 2               | Parties aériennes <b>28</b> |
| Pommier | Acarien rouge  | 150 g/hl  | 2               | Parties aériennes <b>28</b> |
| Pommier | Puceron vert   | 150 g/hl  | 2               | Parties aériennes <b>28</b> |

## Mode d'action

Imidan® 50 WP agit par contact, ingestion et inhalation sur plusieurs ravageurs dont il inhibe la cholinestérase. Absorbé par la feuilles mais non véhiculé par la sève. Son action est extrêmement rapide sur certains insectes broyeurs et piqueurs (carpocapse, psylles, cératite, mouche d'olive). Imidan® 50 WP est un insecticide sélectif de nombreux auxiliaires.

## Conseils d'utilisation

Bien mouiller l'ensemble de la végétation  
Effectuer des applications préventives régulières Suivant les avis des stations d'avertissement agricoles.  
Le pH de Stabilité du produit varie entre 5 et 7.  
Si le pH de la bouillie est supérieur à 7, traiter immédiatement.



| الكمية        | الإستعمال                    | طريقة        | الحد الأقصى لتطبيق المبيد | آخر أجل للعلاج قبل الجني | الحول           |
|---------------|------------------------------|--------------|---------------------------|--------------------------|-----------------|
| 100 غ/الهكتار | سيغتيت                       | الجزء العلوي | 1                         | 14 يوم                   | الحوامض         |
| 100 غ/الهكتار | أشجار الزيتون ذبابة الزيتون  | الجزء العلوي | 2                         | 21 يوم                   | أشجار الزيتون   |
| 150 غ/الهكتار | أشجار الإجاص البسيل          | الجزء العلوي | 2                         | 28 يوم                   | أشجار التفاح    |
| 150 غ/الهكتار | أشجار التفاح الكاربووكابس    | الجزء العلوي | 2                         | 28 يوم                   | أشجار التفاح    |
| 150 غ/الهكتار | أشجار التفاح المن الأخضر     | الجزء العلوي | 2                         | 28 يوم                   | العنابك الحمراء |
| 150 غ/الهكتار | أشجار التفاح العنابك الحمراء | الجزء العلوي | 2                         | 28 يوم                   | أشجار التفاح    |

## طريقة العلاج

- إيميدان 50 فعال باللمس، و البلع والإستنشاق.
- يعمل إيميدان على تعطيل الجهاز العصبي للعديد من الحشرات.
- يعمل إيميدان عن طريق الرش.

## نصائح الاستعمال

- ينصح بإستعمال كميات كافية من محلول تمكن من تغطية جميع الأوراق.
- يستعمل إيميدان بكيفية وقائية أيضاً و ذلك حسب التوصيات الجهوية.
- 7-5 : pH
- إذا تجاوزت حموضة محلول 7 فلا تتأخر في العلاج.



ج.م.ش EZZOUHOUR S.A.

**EZZOUHOUR SA**

Lot n°B652 av. Ahmed Al Hansali  
z.i Aït Melloul, Agadir - Maroc

Tél. (+212) 528 24 89 26  
(+212) 664 72 14 73

**FABRICANT. Gowan**

info@ezzouhour.ma  
www.ezzouhour.ma