CoStar

BIOLOGICAL INSECTICIDE

EZZOUHOUR S.A

- **Nouvelle souche exclusive de BT kurstaki**
- **Activité insecticide maximale**
- **Large spectre d'action**
- **Aucun risque de résidus**

CoStar

BIOLOGICAL INSECTICIDE

INSECTICIDE

Composition

Biological Insecticide formulé en micgranules dispersibles contient 85% de Bacillus thuringiensis. Var. Kurstaki sérotype 3A3B, souche SA-12 (90 400UI/mg).

Caracteristiques techniques

Les caractéristiques de la souche SA 12

- Activité insecticide élevée
- Contient divers endotoxines, concentration maximale de Cry1 Ac
- Très efficace à des faibles doses

Caractéristiques de CoStar

- Une mise en suspension élevée et durable
- Une taille minimale des particules pour une meilleure couverture de la surface foliaire
- Formulation WG respectueuse de l'opérateur
- Produit biologique, respecte l'environnement

Costar est caractérisé par une activité insecticide (90 400 UI/mg) la plus élevé.
Cette caractéristique est le résultat de la composition et la concentration des cristaux toxiques, le type de formulation et le procédé de formulation.
En général, les formulations à base de BT contiennent divers profils de toxines qualitatifs (différentes cryo-toxines) et quantitatifs (concentrations différents). Costar est le BTK avec la plus grande quantité de toxine Cry1Ac.
Costar à également une formulation de granulés dispersibles dans l'eau (WG) innovante encore et stabilise les qualités intrinsèques de la BTK SA 12.

Compatibilité

Costar est compatible avec la plupart des insecticides et fongicides. Ne pas mélanger avec, ou appliquer dans les 2 jours suivants l'application de produits alcalins tels que les cuivres, les sulfates ou la bouillie bordelaise, car ils peuvent altérer l'efficacité

Recommandations

Appliquer le produit dès la détection des premiers signes d'attaque ou d'apparition des larves. Son action insecticide par ingestion exige une distribution uniforme sur toute la surface des feuilles, en utilisant un volume de pulvérisation élevé à l'hectare. Costar est plus efficace contre les larves nouvellement écloses L1 &L2, un programme de dépistage pour déterminer les infestations précoces est recommandé. Après avoir consommé la dose létale de Costar, les larves s'arrêtent de s'alimenter en général moins d'une heure, mais peuvent rester sur le feuillage jusqu'à ce qu'ils meurent, généralement en quelques jours. Il est très important de traiter avec Costar l'après-midi, afin d'éviter autant que possible la désactivation partielle du produit par les rayons ultraviolets.

Usages

TOMATE	DOSE	DAR
Tûta absoluta	0,5 kg/ha	0j

FABRICANT.
CERTIS

Homologation n° :
F03-0-008

DISTRIBUTEUR.
EZZOUHOUR SA

ADRESSE.
Lot n°B652 av. Ahmed Al Hansali
Z.I Aït Melloul 80150
Agadir - Maroc

CONTACT.
+212 528 248 926
+212 528 240 569
+212 664 721 473

info@ezzouhour.ma
www.ezzouhour.ma

Copyright © Ezzouhour S.A